


477
Z.D.



Insecten Cabinet

Nach der Natur gezeichnet
und gestochen
von Jacob Sturm Junior.

1791.
II-tes Stük.

Zu finden in Nürnberg bey dem Verfasser.

Stück 2, 1791.

1.



Scarabaeus porcatius.



Z.D.



Hister unicolor.




Z.D.

Stük 2, 1791.

3



Dermestes violaceus.




Z-D.

Stück 2, 1791

4



Anthrenus Scrophulariae.



Z.D.



Ptinus imperialis.



Z.D.

Stück 2, 1791.

6



Ptinus Scotias.



Z.i.

Stück 2, 1791.

7



Microphorus respillo.



Z.D.

Stück 2, 1791.

8



Silpha obscura.



Z.D.

Stück 2, 1791.

9



Opatrum sabulosum.



Z.D.

Stück 2, 1791.

10



Cassida grossa.



Z-D.

Stück 2, 1791.

11



Cryptocephalus sericeus.



Z.D.

Stück 2 1791.

12



Chrysomela speciosa.



Z-D.


Stück 2



Curculio Ser

(lanipes, ist nicht Hel.)
 Ein mollar Helopogon quinquatus, annu
 e, des bekantlich viel größer, anders geformt
 is (sollt erforschen). H. glaber. Bom.
 Voct. aemula (die abgabildeten G. aus
 zu sein, alle ist natürlich Nörschkeit in
 der betrifft, so finden sich die G. in fast
 alle, n. grünlich grün, bei der Bomb.
 ist Mischung n. die T. in der G. in der
 aemula in der G. in der G. in der G.
 7. 5 Jun. 1793.

L.D.



Z-D.



Z-D.

Stück 2 1791.


13.



Curculio Scrophulariae.

Der Carabus leucophthalmus abändern wollen. Helops ^(anipet, i. n. H. Hel.) quisquilius; wenig
 aus jener nicht die angegebenen Fehler, der bekanntlich viel größer, anders geformt,
 u. metallfarbig ist. Helops quisquilius (sollt. rufessim. H. glaber. Bom-
 bix argentina; Bomb. compressa; Noct. aemula (die abgeändert ist, aus
 jener dieses sehr unmerkliche arten rühren alle ihr natürliches Wesen nicht
 mehr besitzen zu sehen, den was die röhre betrifft, so finden wir die Grünspeck
 und die Feigler sehr viel dunkler, u. grünlichgrün, bei der Bomb.
 compressa kommen wir die bläulich Weissung u. die Tüpfelröhren in den
 in althieran fließend, u. bei der Noct. aemula die Röhrenfläden am Untersatz
 u. O. Oberdentsch. Alex. Lit. Zeit. 7. 5 Jun. 1793.

卷二





Z.D.

Stück 2 1791.

14



Curculio imperialis.



Z.D.



Curculio albinus.



Z-D.

Stück 2 1791.

16.



Curculio Morio.



Z-D.



Clerus formicarius.



Z.D.

Stück 2 1791

18



Notoxus mollis.




Z-D.

Stück 2, 1791.

19



Notoxus monoceros.



Z-D.

Stuk 2 1791

20



Cerambyx *alpinus*.




Z-D.

Stück 2 1791.

21.



Saperda praeusta.



Z-D.



Lampyris corusca.




Z-D.

Stück 2 1791.

23.




Elatér thoracicus.



Z-D.



Forficula minor.




Z.D.

Stück 2, 1791.

25



Cimex festivus.



Z-D.



